

# Avertissements agricoles

BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
RHÔNE-ALPES

RÉGION  
RHÔNE-ALPES



ABONNEMENT ANNUEL : 125 F  
RÉGISSEUR RECETTES D.R.A.F.

Tél. : 78.63.25.65

165, rue Garibaldi - Bât. B - B.P. 3202 - 69401 LYON CEDEX 03

1er Septembre 1988

N° de série continue 366

Bulletin n° 20

Carpocapse - Fin de la protection  
Maladies de conservation - Intervenez avant la récolte  
Tordeuse Orientale du pêcher - Protégez les variétés tardives  
Tous Arbres Fruitiers - Surveillez les populations d'acariens rouges

## CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Quel que soit le secteur de la région, les prises de papillons dans les pièges sexuels se situent à un niveau très faible, aussi la protection peut être suspendue.

## MINEUSE CERCLEE

Dans les parcelles dont la production est destinée vers les pays d'Amérique du Nord, effectuez une application de méthomyl à partir du 1er Septembre, afin de détruire les jeunes larves issues du troisième vol.

Délai d'utilisation du méthomyl avant récolte : 7 jours.

## MALADIES DE CONSERVATION DES POMMES ET DES POIRES

### Tavelures

Dans les parcelles où ce champignon est présent, il est nécessaire de poursuivre les traitements afin de diminuer les risques de contamination sur fruits.

### Gloesporium (la variété Golden est sensible à ce champignon)

Dans les plantations où le risque "Gloesporium" existe, appliquez un deuxième traitement dès à présent.

### Botrytis - Monilioses - Penicillium

Appliquez un fongicide 4 à 5 jours avant la récolte.

Pour le choix des produits reportez-vous au Bulletin précédent (n° 19 du 11 Août 1988).

Dans le Bulletin n° 19 du 11/08/88, une rectification est à effectuer dans la rubrique "Maladies de conservation des pommes et des poires" ; les fongicides efficaces sur pénicillium (triadiméfon - bitertanol - fluzilazol) sont homologués pour lutter contre les tavelures et non contre les monilioses.

## TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER

Une diminution des prises de papillons dans les pièges sexuels est constatée dans tous secteurs de la région.

Le dernier traitement est à appliquer 15 jours avant la récolte, si une forte pluviométrie (25 à 30 mm) intervient dans les 8 à 10 jours précédant la cueillette, renouvelez l'application.

### Produits utilisables

deltaméthrine  
fluvalinate  
méthomyl

DECIS

KLARTAN

LANNATE 20 L - METOVER

Délai d'emploi avant récolte  
sans délai

7 jours

7 jours

7633



## TOUS ARBRES FRUITIERS

### ACARIENS ROUGES

Des larves et des adultes peuvent être observés, principalement sur pêchers, pommiers et poiriers.

Il est inutile de laisser accroître les populations d'acariens rouges, aussi nous vous conseillons d'appliquer un produit larvicide adulticide dès que 50 % du feuillage est occupé par une forme mobile.

Sur les variétés non récoltées à ce jour, respectez les délais d'utilisation avant récolte.

Produits utilisables		Délai avant récolte
propargite	OMITE 30 WP (utiliser uniquement sur pommiers)	21 jours
dicofol + tétradifon	KELTHION	15 jours
benzoximate	ARTABAN	15 jours
bromopropylate	NEORON	15 jours
dicofol	Nombreuses spécialités	15 jours
biphenthrine	TALSTAR FLO	sans délai

## VIGNE

### BOTRYTIS

Les 2 à 3 interventions conseillées de la floraison à la véraison devraient permettre de diminuer les attaques du Botrytis au moment des vendanges.

Par contre l'expérimentation de ces dernières années a montré qu'un traitement réalisé 3 semaines avant vendange n'a qu'une efficacité réduite et d'autre part il peut présenter des inconvénients (blocage de la fermentation, risque de résidus dans les vins avec certains produits, augmentation de la résistance du Botrytis aux imides).

Par conséquent, nous déconseillons cette dernière intervention.

### TORDEUSES

Le troisième vol d'Eudémis a débuté à Tain l'Hermitage le 15 Août mais il reste faible.

Par contre, dans certains cas on a observé des captures tardives faibles de la 2ème génération d'Eudémis ou de Cochylis début Août. Cela pourrait provoquer quelques attaques locales de Vers de la grappe.

Pour les vignes vendangées tardivement surveillez encore les parcelles sensibles habituellement aux attaques de vers et intervenez en cas de perforations des grains avec un produit curatif (attention aux délais d'emploi avant vendanges).

### FLAVESCENCE DOREE Repérez les vignes atteintes par cette grave maladie.


Les symptômes vont bientôt réapparaître :

Sur cépage rouge : rougissement des feuilles, taches bien délimitées par les nervures.

Sur cépage blanc : jaunissement des feuilles.

Dans tous les cas : enroulement des feuilles et non aoûtement des bois.

En cas de forte attaque : dessèchement et flétrissement des grappes ou raisins très acides.



Le service de la protection des végétaux et le journal  
"LA FRANCE AGRICOLE" s'unissent pour vous proposer :

**Les Avertissements Agricoles sur Minitel**

**36.15 code FA3**

- Grandes cultures
- Arboriculture
- Viticulture

- PVRACULT
- PVRAARBO
- PVRAVITI

**la France  
agricole**